



STATION POITOU-CHARENTES

# VERTISSEMENTS GRICOLES<sup>®</sup> télécopiés

EDITION GRANDES CULTURES



Bulletin n° 349 (15/97) 29 Mai 1997

**POIS :** Traitements tordeuses en parcelles non protégées  
**MAIS :** Pyrale, début du vol

**POIS : stade floraison à gousses pleines.****TORDEUSES**Situation - Préconisation

Les captures se poursuivent.

**Pois de consommation :** Intervenir dès le stade gousses pleines du second niveau florifère.**Pois de semences :** Ils ont dû être traités ; n'oublier pas de renouveler la protection 15 jours après le premier traitement.**BLE : stade amande aqueuse à grain laiteux.****PUCERONS**Situation - Préconisation

Malgré un vol très faible à la tour de Biard ; le réseau d'observations nous indique que des populations assez importantes sont signalées localement en Charente, Charente-Maritime et sud Deux-Sèvres.

**Surveiller les parcelles** jusqu'au stade laiteux-pâteux et **Intervenir si nécessaire.****TOURNESOL : stade B2 à B6****PHOMOPSIS**

A Biard, le taux de maturation est de 20 %, (il est vraisemblablement plus élevé en sud Charente et sur la façade atlantique) Aucune projection n'a été observée.

**PUCERONS**

Les captures à la tour restent très faibles.

En parcelles, une légère augmentation des populations d'aptères est notée mais les seuils ne sont pas atteints (voir bulletin précédent).

**Surveiller** les parcelles non protégées Gauchon surtout en situations tardives et intervenir si nécessaire.**MAIS : stade 4 à 8 feuilles****SESAMIE**Situation

Le vol se poursuit de façon irrégulière en Charente-Maritime ; il a commencé en sud Charente.

Le nombre de captures est faible à ce jour. Des pieds de ponte ont été observés dans le secteur de Mirambeau (sud Charente-Maritime).

Préconisation

Les indications du dernier bulletin sont confirmées :

- En zone 1 ainsi qu'en présence de pieds de ponte en parcelles à risque en zone 2, **Intervenir très rapidement à demi-dose** dans les parcelles pas encore protégées (prévoir le renouvellement de l'intervention une quinzaine de jours plus tard).- En zone 3 : en présence de pieds de ponte en parcelles à risque, l'intervention unique à pleine dose est à effectuer du **2 au 10 juin** ; il en est de même lorsque le fort développement de la culture ne permet pas de retenir la stratégie à 2 applications en zone 1 et dans les parcelles concernées en zone 2.**PYRALE**

Les premières captures sont signalées en sud Vienne et en Charente.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt  
 SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
 13 Route de la Forêt - 86580-BIARD -  
 Tél. 05 49 62 98 25 - Fax 05 49 62 98 26

Publication périodique  
 Directeur gerant : L. JUILLARD-CONDAT  
 CPPAP N° 1664 A D  
 ISSN 0294 - 4693

29-05-1997 12:01

BnF  
S&T

99%

P.01

D3 40 I 40830

741